



SAVJETODAVNA SLUŽBA

Obavijest maslinarima

09.06.2015. **Podružnica Splitsko-dalmatinske županije**

Pregledom lovnih trapova na opažakim lokalitetima bilježi se **jaki let 2.generacije maslinovog moljca** (*Prays oleae*).

Savjetujemo maslinarima da obave zaštitu maslina kada je plod masline veličine 4-5 mm.

Za suzbijanje maslinovog moljca mogu se koristiti pripravci na osnovi **dimetoata** (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion, Calinogor) ili **deltametrina** (Decis 2,5 EC).

Pripravak na osnovi deltametrina ima slabije djelovanje pri povišenim temperaturama.

Pripravci dozvoljeni **za suzbijanje gusjenica maslinovog moljca u ekološkoj proizvodnji** su Baturad WP ili Biobit WP ili Neemazal T/S.

Također se preporuča redoviti tjedni pregled maslina do okoštavanja na prisutnost **maslinovog svrdlaša** (*Rynchites cribripennis*), posebno u maslinicima na kamenitim površinama te koji su u blizini zapuštenih i neobrađenih maslinika. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova.

Svrdlaš najveće štete radi nakon oplodnje na malim plodovima, nakon uboda plodovi vrlo brzo crne i otpadaju.

Za suzbijanje maslinovog svrdlaša u RH registriran je pripravak Rogor 40.

Provođenjem mjera za suzbijanje maslinovog moljca ujedno djelujemo i na smanjenje prisutnosti maslinovog svrdlaša.

Tretiranja za svrdlaša treba isključivo provoditi na temelju pregleda i prema procjeni inteziteta pojave štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite po mirnom vremenu sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja

Silvija Marušić dipl.ing.agronomije

e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Žarko Kovačić dipl.ing.agronomije

e-mail: Zarko.Kovacic@savjetodavna.hr